

НОРМОФЛОР-CHICKEN

кормовой пробиотический концентрат

Нормофлор-chicken – аутолитическая пробиотическая добавка при выращивании птицы. Содержит биомассу депонированных аутоштаммов молочнокислых лактобактерий и энтеробактерий, выделенных из кишечника молодняка высокопородных кур - несушек и бройлеров. Общее количество жизнеспособных клеток в 1 мл кормовой добавки не менее 1×10^8 КОЕ.

Аутоштаммы, в отличие от стандартной транзиторной микрофлоры, обладают повышенной приживаемостью и функциональной активностью в желудочно-кишечном тракте высокопородных кроссов кур.

Биологические особенности высокопродуктивной сельскохозяйственной птицы, требуют повышения функциональной активности пищеварительной системы, особенно ее ферментативной активности и способности с максимальной скоростью извлекать питательные компоненты из корма и вовлекать их в биосинтетические процессы, происходящие в организме. Этого можно достичь только за счет коррекции микрофлоры желудочно-кишечного тракта при использовании в процессе выращивания эффективных комплексов микроорганизмов аутоштаммов в составе пробиотических комплексов.

Бактерии продуцируют биологически-активные вещества, которые улучшают расщепление питательных веществ корма, способствуют улучшению обмена веществ, препятствуют развитию гнилостных процессов и условно-патогенной микрофлоры.

В результате сбраживания углеводов аутобактерии образуют молочную кислоту, а также в меньших количествах янтарную и фумаровую кислоты, продуцируют бактериоцины обладающие высокой антагонистической активностью в отношении возбудителей дизентерии, энтеропатогенных кишечных палочек, стафилококка, протея.

Благодаря уникальным свойствам аутоштаммов, Нормофлор-chicken обеспечивает перевариваемость питательных веществ рациона, стимулирует обменные процессы, повышает неспецифическую резистентность, обеспечивает сохранность поголовья, увеличивает прирост живой массы и снижает расход корма на единицу продукции.

Рекомендации по применению:

Нормофлор-chicken применяют цыплятам-бройлерам, несушкам, родительскому стаду групповым методом с водой в дозировке: 1 л на 1 тонну воды или индивидуально в количестве 0,5 мл на 1 кг массы тела с первых дней жизни 10 дней подряд и далее, каждые первые 10 дней каждого последующего месяца жизни в течение всего периода выращивания.

Перед приготовлением маточного или рабочего растворов Нормофлор-chicken, суспензию необходимо интенсивно взболтать. Температура воды для приготовления этих растворов, не должна превышать 18 °C. Время выпаривания готового рабочего раствора цыплятам-бройлерам, не должно превышать 3-4 часов. Разведенный раствор и вскрытый флакон не хранить – использовать сразу после вскрытия.

Продукция птицеводства после применения Нормофлор-chicken используется без ограничений

Форма выпуска:

Стеклянные флаконы - 10, 100, 250, 400 мл

Полимерные флаконы и канистры - 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 и 1 л